

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Octenidine Klosterfrau 2,6 mg losengid

oktenidiindivesinikkloriid (*octenidini dihydrochloridum*)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast nelja päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Octenidine Klosterfrau ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Octenidine Klosterfrau kasutamist
3. Kuidas Octenidine Klosterfraud kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Octenidine Klosterfraud säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Octenidine Klosterfrau ja milleks seda kasutatakse

Octenidine Klosterfrau sisaldab toimeainet oktenidiindivesinikkloriidi. See on antiseptiline aine, mis on tõhus patogeenide vastu, hävitades nende rakufunktsiooni.

Octenidine Klosterfraud kasutatakse lühiajaliseks suu ja neelu limaskesta põletiku raviks, mille tüüpilised sümptomid on valu, punetus ning turse.

Octenidine Klosterfrau on näidustatud täiskasvanutele ning noorukitele alates 12 aasta vanusest.

Kui pärast nelja päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Octenidine Klosterfrau kasutamist

Octenidine Klosterfraud ei tohi kasutada

- kui olete oktenidiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Octenidine Klosterfrau kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Ärge kasutage seda ravimit üle nelja päeva.

Lapsed

Octenidine Klosterfrau ohutus ja tõhusus lastel vanuses 0...11 aastat ei ole veel tõestatud.

Muud ravimid ja Octenidine Klosterfrau

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Koostoimeid ei ole uuritud.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Rasedad peavad enne Octenidine Klosterfrau kasutamist pidama nõu arstiga.

Imetamine

Puudub piisav teave oktenidiindivesinikkloriidi eritumise kohta rinnapiima.

Riski imikutele ei saa välistada. Octenidine Klosterfrau ei tohi seetõttu imetamise ajal kasutada.

Fertiilsus

Vastavaid uuringuid ei ole läbi viidud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Octenidine Klosterfrau sisaldab isomaltitooli (E953).

Üks loseng sisaldab 2,57 g suhkruasendajat isomaltitooli, mis vastab ligikaudu 6 kcal (26 kJ). Seda tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel. Võib omada nõrka lahtistavat toimet.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Octenidine Klosterfrau kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitavad annused on järgmised:

kui ei ole teisiti ette nähtud, peavad 12-aastased ja vanemad noorukid ning täiskasvanud kasutama ühte losengi iga 2...3 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on kuus losengi.

Manustamisviis:

losengi tuleb suus aktiivselt ja pidevalt imeda. Losengi tuleb suus ringi liigutada, kuni see on täielikult lahustunud.

Arsti soovituseta ei tohi Octenidine Klosterfrau kasutada üle nelja päeva.

Kõrvaltoimete esinemist saab vähendada, kui kasutada sümptomite kontrollimiseks väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese ajal jooksul.

Kui te kasutate Octenidine Klosterfrau rohkem, kui ette nähtud

Ebatõenäolise üleannustamise korral võivad kirjeldatud kõrvaltoimed tugevneda. Sellisel juhul pöörduge sümptomaatilise ravi saamiseks oma arsti poole.

Kui te unustate Octenidine Klosterfrau kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

- suu- ja mao limaskestast ärritus, nagu düsgeusia, suukuivus, düspepsia, iiveldus ja kõhuvalu;
- keele värvuse muutus;
- allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Octenidine Klosterfrau säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida blistrit väliskarbis valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave**Mida Octenidine Klosterfrau sisaldab**

- Toimeaine on oktenidiindivesinikkloriid. Üks loseng sisaldab 2,6 mg oktenidiindivesinikkloriidi.
- Teised abiained on isomaltitool (E953), viinhape, maitse- ja lõhnaaine maitse parandamiseks (sisaldab propüleenglükooli, kohviekstrakti ja 4-(2,2,3-trimetüülsüklopentüül)butaanhapet), tähtaniisipuuõli, piparmündiõli, sukraloos (E955).

Kuidas Octenidine Klosterfrau välja näeb ja pakendi sisu

Losengid on elevandiluuvärvi, ümmargused ja veidi läbipaistvad.

Octenidine Klosterfrau on saadaval pappkarpides, mis sisaldavad 12, 16, 20 või 24 losengi, mis on pakitud PVC/PVDC-st ja alumiiniumfooliumist blistritesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjaMüügiloa hoidja

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Cologne
Saksamaa

Tootja

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin
Saksamaa

Ravim on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa, Luksemburg: Laryngomedin Octenidin Antisept
Austria: Octeangin antisept 2,6 mg Pastillen
Belgia, Bulgaaria, Ungari, Poola, Rumeenia: Octeangin
Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia: Octenidine Klosterfrau
Horvaatia: Oktenidindiklorid Klosterfrau
Sloveenia: Oktenidin Klosterfrau

Infoleht on viimati uuendatud mais 2025.